

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御纂醫宗金鑑卷二十一



臣

王杰詳校

詳校官主事

臣陳本

欽定四庫全書薈要

御纂醫宗金鑑卷二十一

訂正仲景全書金匱要畧註中之二目錄



痰飲欬嗽篇第十三

小半夏加茯苓湯

小半夏湯

五苓散

茯苓桂枝白朮甘草湯

甘遂半夏湯

厚朴大黃湯

防己椒目葶藶大黃圓

十棗湯

大青龍湯

小青龍湯

木防己湯

木防己加茯苓芒消湯

澤瀉湯

茯苓桂枝五味甘草湯

茯苓五味去桂加乾薑細辛湯

茯苓五味甘草去甘草桂加乾薑細辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏大黃湯

消渴小便利淋篇第十四

豬苓湯

文蛤散

栝蒌瞿麥圓

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎鹽湯

水氣病篇第十五

枳實白朮湯

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加朮湯

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

杏子湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝加黃耆湯

欽定四庫全書醫要卷一萬四百七十五

子部

御纂醫宗金鑑卷二十一

訂正仲景全書金匱要畧註中之二

痰飲欬嗽病脈證并治第十三

夫病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後裏虛脈偏弦者飲也

按此條微者短氣之下古本有脈雙弦者寒也等句

文義不屬當另分為一條在後

註

凡病人食少飲多小便利者為消渴病小便不利者為留飲病留飲者即今之停水飲病也若水停上焦胸中則壅肺氣不得降故暴喘滿也若水停中焦心下甚者則凌心故病悸動不安微者則礙肺故病呼吸短氣若水停下焦少腹則不輸膀胱故必苦裏急也仲景于此但言上中二焦不及下焦者非畧之也謂已詳於傷寒論中也

集註程林曰飲水多則水氣停泛於胸膈必暴喘滿也

凡人食少飲多則胃土不能游溢精氣甚者必停於心下而為悸微者則阻於胸膈而為短氣也

先渴後嘔為水停心下此屬飲家小半夏茯苓湯主之

註

水停心下中焦部也中焦屬胃故不止病悸短氣

而亦病嘔也病悸短氣者是水停胃外從膈下而上干於胸也病嘔者是水停胃內從胃中而上越於口也然必先渴飲水多而後作嘔者方屬飲家

嘔病也主小半夏湯者以止嘔也加茯苓者以飲水多而病嘔故兼利水也

集註魏荔彤曰水停心下阻隔正氣不化生津液上於

胸咽故渴也渴必飲水水得水而愈恣其衝逆所以先渴而後必嘔也此屬飲家當治其飲不可以為渴家治其渴也治飲則用辛燥治渴必用寒潤大相徑庭可不明其屬於何家而妄治之乎

尤怡曰先渴後嘔者本無嘔病因渴飲水水多不

下而反上逆也故曰此屬飲家小半夏止嘔降逆
加茯苓去其停水

小半夏加茯苓湯方

半夏一升

生薑半觔

茯苓三兩

右三味以水七升煮取一升五合分溫再服

嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也小
半夏湯主之

註飲家渴者是水停氣不化生津液而渴也嘔家渴者是嘔吐胃乾燥傷津液而渴也故曰嘔家本應渴也先嘔後渴者當少少與飲之以和胃生津為欲解也若嘔吐後反不渴者是必心下素有支飲故也惟主小半夏湯止嘔而不加茯苓者以不渴並無新飲且嘔後已傷津液不可再行利水重竭津液也

集註李廷曰此專以治嘔言嘔家渴者為欲解以胃氣

復而津液生也若心下素有支飲則不燥自當不
渴泛溢而嘔也半夏生薑溫能和胃氣卒能散逆
氣為嘔家聖藥

小半夏湯方

半夏一升

生薑半觔

右二味以水七升煮取一升半分溫再服

集解沈明宗曰此支飲上溢而嘔之方也凡作嘔必傷

津液應當作渴故為嘔家本渴渴則病從嘔去謂

之欲解若心下有支飲停蓄胸膈致燥故嘔而不渴則當治飲所以生薑散邪半夏滌飲嘔自止矣卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者半夏加茯苓湯主之

註卒然嘔吐雖然不渴而心下痞塞是膈間有水凝

結也眩者是水阻陽氣不升也悸者是水氣上干於心也即不渴無新飲而平日飲盛可知則不必顧及津液亦必加茯苓以利水斯結可開而阻可通也

集註趙良曰心下痞膈間有水眩悸者陽氣必不宣散

也經云以辛散之半夏生薑皆味辛本草半夏可
治膈上痰心下堅嘔逆眩者亦上焦陽氣虛不能
升發所以半夏生薑並治之悸則心受水凌非半
夏可獨治必加茯苓去水下腎逆以安神神安則
悸愈也

尤怡曰飲氣逆於胃則嘔吐滯於氣則心下痞凌
於心則悸蔽於陽則眩半夏生薑止嘔降逆加茯

卷二十一
苓去其水也

半夏加茯苓湯方

見前

假令瘦人臍下有悸吐涎沫而顛眩此水也五苓散主之

按瘦人之瘦字當是病字顛眩之顛字當是顛字顛者頭也文義相屬此傳寫之譌

註悸者築築然跳動病也上條心下有悸是水停心下為病也此條臍下有悸是水停臍下為病也若

欲作奔豚則為陽虛當以茯苓桂枝甘草大棗湯
主之今吐涎沫水逆胃也顛眩水阻陽也則為水
盛故以五苓散主之也

五苓散方

澤瀉

一兩一分

猪苓

三分
去皮

茯苓

三分

白朮

三分

桂

二分
去皮

右五味為末白飲服方寸匕日三服多飲煖水汗

出愈

夫短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之

註水停心下甚者病悸已明其治矣微者短氣其治有二氣虛短氣是氣少不能長息而短也微飲短氣是水停阻礙呼吸而短也若呼之氣短是心肺之陽有礙也用苓桂朮甘湯以通其陽陽氣通則膀胱之竅利矣吸之氣短是肝腎之陰有礙也用

腎氣丸以通其陰陰氣通則小便之闕開矣故曰
苓桂朮甘湯主之腎氣丸亦主之也

茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓

四兩

桂枝

白朮

各三兩

甘草

二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

腎氣丸方

見婦人雜病中

集解

尤怡曰飲水病也治水必自小便去之苓桂朮甘

益土氣以行水腎氣丸溫陽氣以行水雖所主不同而利小便則一也

夫心下有留飲其人背寒冷如掌大留飲者脇下痛引缺盆欬嗽則轉甚胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛脈沉者有留飲

按此條古本內於四肢歷節痛之下有脈沉者有留飲一句當另為一條始合論脈之義短氣而渴之渴字當是喘字四肢上當有缺文皆傳寫之譌

註
停飲初病即以小半夏湯加茯苓五苓散腎氣丸
等藥治之而愈者微邪也若邪甚而不去者留於
心上則阻心陽必背寒冷留於脇下則礙肝氣必
脇下痛引缺盆欬轉甚留於胸中則壅肺氣必
短氣而喘留於身體則塞經絡必四肢歷節痛也
由此推之留於脾則腹腫身重留於腎則囊足脛
腫理必然也

膈上病痰滿喘咳吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其

人振振身潤劇必有伏飲

註傷飲之病留而不去謂之留飲伏而難攻謂之伏飲伏飲者乃飲留膈上伏而不出發作有時者也即今之或值秋寒或感春風發則必喘滿咳吐痰盛寒熱背痛腰疼咳劇則目泣自出咳甚則振振身動世俗所謂吼喘病也

集註

程林曰痰飲留於膈則令人喘咳吐發於外則令人寒熱背痛腰疼咳甚則肺葉舉而目泣出喘甚

則息搖肩而振振身瞤如此劇者必有伏飲

鯀浮而細滑傷飲

註凡飲病得鯀浮而細滑者為痰飲初病水邪未深之診也

集註李彭曰飲鯀當沉今鯀浮者水在肺也

鯀沉者有留飲

按此條係在四肢歷節痛之下今分在此

註凡飲病得鯀沈者為留飲水邪將深之診也

集註程林曰鯀得諸沉者當責有水故鯀沉者為水飲

李彥曰經云沉潛水蓄是也

病者鯀伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之

按此為留飲欲去故也句當在利反快之下必傳寫之謬

註凡飲病得鯀伏者為伏飲水邪已深之診也凡病飲之人欲自下利利後通快此為所留之飲欲自

去而愈故也若雖利反不快心下續有堅滿乃
所留之飲盤結不欲去也宜攻之以甘遂半夏湯
方中反佐甘草以激之意在所向無前即潛伏難
攻水結未有不破者因自下利故又佐芍藥以約
束之防勝後窮追不止也

甘遂半夏湯方

甘遂

大者三枚

半夏

十二枚以水一升煮取半升去滓

芍藥

五枚

甘草

如指大一枚炙

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁煎取八合頓服之

集解

程林曰留者行之用甘遂以決水飲結者散之用半夏以散痰飲甘遂之性直達恐其過於行水緩以甘草白蜜之甘收以為藥之酸雖甘草甘遂相反而實有以相使此酸收甘緩約之之法也靈樞經曰約方猶約囊其斯之謂歟

尤怡曰甘草與甘遂相反而同用之者蓋欲其一

戰而留飲盡去因相激而相成也芍藥白蜜不特
安中亦緩藥毒耳

問曰夫飲有四何謂也師曰有痰飲有懸飲有溢飲有
支飲問曰四飲何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸
間漚漚有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬吐引痛謂
之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼
重謂之溢飲欬逆倚息氣短不得卧其形如腫謂之支
飲

註

設問曰夫飲不止於留飲伏飲也而世謂飲有四

者何也師曰留飲伏飲言飲病新久深淺之理也

今世所謂四者有痰飲懸飲溢飲支飲言飲病之
情狀也四飲亦不外乎留飲伏飲之理但因其水
流之處特分之為四耳由其狀而命之名故有四
也痰飲者水飲走腸間不瀉水精留膈間不輸得
陽煎熬成痰得陰凝聚為飲凡所在處有聲故在
上則喉中有漉漉之聲在下則腸間有漉漉之聲

即今之遇秋冬則發至春夏則止久咳嗽痰喘病也懸飲者飲後水流在脇下不上不下懸結不散欬唾引痛即今之脇下有水氣停飲脇痛病也溢飲者飲後水流行歸於四肢當汗出而不汗出壅塞經表身體疼重即今之風水水腫病也支飲者飲後水停於胸欬逆碍息短氣不得卧其形如水腫狀即今之停飲喘滿不得卧之病也

集註趙良曰水行走下而高原之水流入於川川入於

海塞其川則洪水泛溢而人之飲水亦若是內經
曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸
於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經并行今
所飲之水或因脾氣而不上散或因肺氣而不下
通以致流溢隨處停積而為病也

程林曰內經云土鬱之發飲發於中以其性流衍
不常治法亦有汗下溫利之異

李彭曰夫飲有四而此獨以痰飲名總之水積陰

或為飲飲凝陽或為痰則分而言之飲有四合而
言之總為痰飲而已

尤怡曰素盛今瘦知其津液盡化痰飲故不復外
充形體而反下走腸間也飲水流溢者水多氣逆
也其流於腸下者則為懸飲其歸於四肢者則為
溢飲懸者懸於一處溢者溢於四旁其偏結而上
附心肺者則為支飲支飲者如水之有派木之有
枝附近於臟而不正中也欬逆倚息不得卧者上

迫肺也

水在心心下堅築短氣惡水不欲飲水在肺吐涎沫欲
飲水水在脾少氣身重水在肝脇下支滿噎而痛水在
腎心下悸

按心下悸之心字當是臍字必傳寫之譌

註四飲之水或留膈間或留腸間或留脇下或留肢
體或留胸中然不能盡水之為病也故又發明水
之在心者心下堅鞭短氣而悸不欲飲水也水之

在肺者吐涎沫渴欲飲水也水之在脾者少氣身重也水之在肝者脇下支滿噯而痛也水之在腎者臍下悸也醫者以此觸類而通之則水之病自無遁情矣

支飲胸滿者厚朴大黃湯主之

按支飲胸滿之胸字當是腹字若是胸字無用承氣湯之理是傳寫之謬

註支飲胸滿邪在肺也宜用木防己湯葶藶大棗湯

支飲腹滿邪在胃也故用厚朴大黃湯即小承氣湯也

集注尤怡曰胸滿疑作腹滿支飲多胸滿此何以獨用下法厚朴大黃與小承氣湯同設非腹中痛而閉者未可以此輕試也

厚朴大黃湯方

厚朴一尺

大黃六兩

枳實四枚

右三味以水五升煮取二升分溫再服

心下有痰飲胸脇支滿目眩苓桂朮甘湯主之

註

此承上條詳出其證以明其治也心下有痰飲謂痰飲之水流在膈間故胸脇支滿支滿則阻碍陽氣不得上通於頭目故目眩也主以苓桂朮甘湯者利水而通陽氣也

集註

李彥曰胸脇支滿痰飲停滯於中也目眩阻遏陽氣不上升也茯苓淡滲以利水飲桂枝宣導以行

陽氣白朮去濕健脾甘草和中益氣同為補土制水之劑

苓桂朮甘湯方見上

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣已椒薤黃圓主之

註此又承上條互詳其證以別其治也心下有痰飲喉間有漉漉聲腸間有水氣腸中有漉漉聲者用苓桂朮甘湯即溫藥和之之法也若更腹滿則水結實矣口舌乾燥則水不化矣故以防己椒目葶

蘆大黃前後分攻水結水結開豁則腹滿可除水
化津生則口燥可滋小服而頻示緩治之意稍增
者稍稍增服之口中有津液渴者乃飲渴也加芒
消者以峻藥力耳

集註

李彭曰腹滿水聚於胃也腸間有水氣則濕漬中

焦津液不為灌溉故口舌乾燥前云水走腸間瀝
瀝有聲為痰飲此腸間有水氣即痰飲也

防己椒目葶蘆大黃圓方

防己

椒目

葶藶

熬

大黃 各一兩

右四味末之蜜丸如梧子大先食飲服一九日三服稍增口中有津液渴者加芒消半兩

集解程林曰防己椒目導飲於前清者從小便而出大

黃葶藶推飲於後濁者得從大便而下也此前後分消則腹滿減而水飲行脾氣轉而津液生矣若渴則甚於口舌乾燥加芒消佐諸藥以下腹滿而

救脾土

鯀沉而弦者懸飲內痛

註沉主裏弦主飲懸飲之病屬飲停裏故主懸飲內痛也

病懸飲者十棗湯主之

註此承上條以明其治也主以十棗湯亦形氣實者宜之若形氣稍虛又當臨證斟酌也

集趙良曰鯀沉病在裏也凡弦者為痛為飲為癰懸

飲結積在內作痛故哕見沉弦

十棗湯方

芫花熬

甘遂

大戟各等分

右三味搗篩以水一升五合先煮肥大棗十枚取
八合去滓內藥末強人服一錢七羸人服半錢平
旦溫服之不下者明日更服半錢得快利後糜粥
自養

集解

李彭曰三物皆味苦苦以泄之能直達水飲窠囊之處但恐峻利泄人真元故加大棗甘以緩之且棗為脾果補土所以制水也

病溢飲者當發其汗大青龍湯主之小青龍湯亦主之
註溢飲病屬經表雖當發汗然不無寒熱之別也熱

者以辛涼發其汗大青龍湯寒者以辛溫發其汗
小青龍湯故曰大青龍湯主之小青龍湯亦主之
也

集註 尤怡曰水氣流行歸於四肢當汗出而不汗出身

體重痛謂之溢飲夫四肢陽也水在陰者宜利在

陽者宜汗

大青龍湯方

麻黃

六兩
去節

桂枝

二兩

甘草

二兩
炙

杏仁

四十個
去皮尖

生薑

三兩

大棗

十二
枚

石膏

如雞
子大

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗多者溫粉撲之

小青龍湯方

麻黃

去節
三兩

芍藥

三兩

五味子

半升

乾薑

三兩

甘草

炙
三兩

細辛

三兩

桂枝

三兩

半夏

半升
湯洗

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

集解

尤怡曰大青龍合桂麻而去芍藥加石膏則水氣

不甚而挾熱者宜之倘飲多而寒伏則必以小青龍為當也

肺飲不弦但苦喘短氣

註弦為諸飲之診然專主者肝也水在肝部則病懸飲故脈沉弦也水在肺部則病支飲故脈不弦也

喘咳短氣肺飲證也脇下引痛肝飲證也今亦不見脇下引痛之肝證但見苦喘短氣之肺證故曰肺飲不弦也

集註

李彛曰弦為肝脈故肺飲不弦苦喘短氣肺邪迫塞也前云咳逆倚息短氣為支飲是也

支飲亦喘而不能卧加短氣其脈平也

註

支飲水在肺之病故亦喘而不能卧短氣也其脈平謂見肺之平脈或浮或濇或短此詳申上條不

弦之義也

支飲不得息葶藶大棗湯主之

註此承上條以明其治也喘咳不能卧短氣不得息皆水在肺之急證也故以葶藶大棗湯直瀉肺水也

集註沈明宗曰此支飲偏溢於肺也支飲貯於胸膈上

干於肺氣逆則呼吸難以通徹故不得息然急則治標所以佐大棗之甘以保脾葶藶之苦以泄肺

俾肺氣通調脾得轉輸為峻攻支飲在肺之方也
尤怡曰不得息肺滿而氣閉也葶藶入肺通閉泄
滿用大棗者不使傷正也

葶藶大棗湯方

見肺癰中

膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得
之數十日醫吐下之不愈木防己湯主之虛者即愈實
者三日復發復與不愈者宜木防己湯去石膏加茯苓
芒消湯主之

註
支飲則喘滿不得息水在胸肺也更兼心下痞堅
則水盤結連引膈間故曰膈間支飲也面色鰐黑
水邪深結之色也其脈沉緊水邪深結之脈也水
邪深結故有喘滿痞堅之證也得之數十日醫或
吐之不愈者是水邪不單結在上故越之而不愈
也或下之不愈者是水邪不單結在下雖竭之亦
不愈也心下痞堅飲結在中可知故以木防己湯
開三焦水結通上中下之氣方中用人參以吐下

後傷正也故水邪虛結者服之即愈若水邪實結者雖愈亦復發也即復與前方亦不能愈當以前方減石膏之寒凝加芒消峻開堅結如茯苓直輸水道未有不愈者也

集註

李杲曰喘滿痞堅膈間支飲逆上也面黑者飲屬北方水色也脈沉為飲緊為寒皆陰脈以水飲稟陰寒之氣也吐下俱行不愈則陰陽之氣俱虛木防己湯補虛散飲虛者受補即愈實者飲邪固結

不解故復發不愈乃寒氣凝聚未解故去石膏恐
寒胃也加茯苓淡以滲飲芒消鹹以軟堅

木防己湯方

木防己

三兩

石膏

十二枚
雞子大

桂枝

二兩

人參

四兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服

木防己加茯苓芒消湯方

木防己

桂枝

各二兩

人參

茯苓各四兩

芒消 三合

右四味以水六升煮取二升去滓內芒消再微煎
分溫再服微利則愈

心下有支飲其人苦冒眩澤瀉湯主之

註心下膈下也水在膈上則喘滿水在膈間則痞悸
水在膈下則惟苦眩暈以澤瀉湯之平和小劑主
之治支飲之輕者可也若陽虛水盛又當從事乎

苓桂朮甘湯五苓散矣

集註

尤怡曰水飲之邪上乘清陽之位則為胃眩胃者

昏冒而神不清如有物冒蔽之也眩者目眩轉而
乍見眩黑也澤瀉泄水氣白朮補土氣以勝水也

澤瀉湯方

澤瀉五兩

白朮二兩

右二味以水二升煮取一升分溫再服

病痰飲者當以溫藥和之

註稠濁為痰陽之盛也稀清為飲陰之盛也有痰無
飲當以涼藥治之有飲無痰當以熱藥溫之若痰
而兼飲者此不可純涼又不可純熱故當以溫藥
和之可也

夫有支飲家咳煩胸中痛者不卒死至一百日或一歲
宜十棗湯

註支飲水在膈之上下也水乘肺則咳水乘心則煩
水結胸則痛其人形氣俱實以十棗湯攻之可也

然病此卒不死或至百日或延至一年者以飲陰邪陰性遲故不卒死也

十棗湯方見上

咳家其脈弦為有水十棗湯主之

註此承上條以出其脈也咳家謂久咳之家也咳家未可攻也若脈弦其咳則為有水也有水可攻故以十棗湯攻之

集註魏荔彤曰咳嗽者有飲冷而咳嗽者有因外感風

寒而咳嗽者所謂形寒飲冷則傷肺也此外感風寒之咳嗽也有因傷倦而咳嗽者所謂陰虛內熱火刑肺金此內傷虛勞之咳嗽也於此俱無涉也仲景命之曰咳家專為痰飲在內逆氣上衝之咳嗽言也故其脈必弦無外感家之浮無內虛家之數但見弦者知有水飲在中為患也主之以十棗湯使水邪有所制斯下注而免於上厥也

脈雙弦者寒也皆大下後裏虛脈偏弦者飲也

按此條係在首條微者短氣之下今分在此

註 脉雙弦者兩手左右脉皆弦也偏弦者或左或右
脉單弦也偏弦者飲也故當下之雙弦者寒也不
當下也即偏弦當下亦不可大下若大下之則虛
其裏單弦變而為雙弦矣弦為陰脉重陰則寒故
曰雙弦者寒也此又示人不可以弦脉為主飲也
脉弦數有寒飲冬夏難治

按 脉弦數之數字當是遲字始與寒飲之理合是傳

寫之謬

註單弦主飲固當下也若單弦兼遲而有寒飲不可下也寒飲之咳冬夏難治者以夏陰極於內冬陰極於外故也此承上二條詳申弦脈飲病可下不可下之義也

久咳數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家

註久咳數歲即今之年年舉發痰飲咳嗽水喘之病

也若其脈弱者知邪不進則為可治若實大數者知邪日進故死也若脈虛者知正氣虛必苦冒也審其人素本有支飲則不必治其咳宜於痰飲家求治法也

集註尤怡曰久咳數歲不已者支飲漬肺而咳飲久不

已則咳久不愈也咳久者其氣必虛而脈反實大數者則其邪猶盛以猶盛之邪而臨已虛之氣其能久持乎故死若脈虛者正氣固虛而飲氣亦衰

故可治然飲雖衰而正不能禦亦足以上蔽清陽之氣故其人必苦冒也此病為支飲所致去其飲則病自愈故曰治屬飲家

咳逆倚息不得卧小青龍湯主之青龍湯下已多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣從少腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味甘草湯治其氣衝衝氣即低而反更咳胸滿者用苓桂五味甘草湯去桂加乾薑細辛以治

其咳滿咳滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑
為熱藥也服之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲者
法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水茯苓桂枝
五味甘草湯去甘草桂枝加細辛乾薑半夏湯主之水
去嘔止其人形腫者加杏仁主之其證應內麻黃以其
人遂痺故不內之若逆而內之者必厥所以然者以其
人血虛麻黃發其陽故也若面熱如醉此為胃熱上衝
薰其面加大黃以利之

按小青龍湯下已之下字當是汗字大小青龍湯皆汗劑必是傳寫之譌

註咳逆古咳嗽名也倚息今呼吸促也咳嗽呼吸氣促不得卧久病多屬痰飲新病每兼形寒故宜以小青龍湯汗之以散內飲外寒也小青龍湯辛溫大散惟有餘之人宜之若誤施之於不足之人辛熱則傷陰故多唾口燥也大散則傷陽故手足厥逆也面熱如醉陽外浮也小便難氣上衝陰內竭

也。脈沉微，裏氣弱也。手足痺，表氣虛也。時復冒虛之甚也。雖陰陽表裏俱虛，然屬誤汗，寒熱錯雜之壞病。故與茯苓桂枝五味甘草湯，先通陽和陰，俟上衝氣平，再議他法也。今氣衝雖下而反更咳嗽，胸滿者，則知寒飲貯胸，故嫌桂枝偏於走表，加乾薑細辛獨勝中之寒飲也。服之咳滿即止而更復渴，衝氣復發，則知陰火上逆為乾薑細辛熱藥所動故也。若服之時遂渴稍時而渴反止者，則為其

人素有支飲也支飲者法當冒冒者是因飲逆胸中作嘔而胃非陽虛為飲所阻不升之胃也故仍以本方復加半夏者以去水也更去甘草者恐甘助嘔也水去嘔止其人面形腫者加杏仁以降嘔咳上逆之餘邪若不因嘔咳面腫則為風邪所襲應加麻黃今其人血虛手足痺陽虛手足厥且因嘔咳後而腫故不加也若兼有面熱如醉此為胃熱上衝薰其面更加大黃以利胃熱可也

苓桂五味甘草湯方

茯苓

四兩

桂枝

四兩

甘草

三兩
炙

五味子

半升

右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服

苓甘五味薑辛湯方

茯苓

四兩

甘草

乾薑

細辛

各三兩

五味子

半升

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三服

苓桂五味甘草去甘草去桂加乾薑細辛半夏湯方

茯苓

四兩

細辛

乾薑

各二兩

五味子

半夏

各半升

右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯方

茯苓四兩

甘草三兩

五味子半升

乾薑三兩

細辛三兩

半夏半升

杏仁半升去
皮尖

右七味以水一斗煮取三升去滓溫服半升日三

苓甘五味加薑半半杏大黃湯方

茯苓四兩

半夏半升

甘草三兩

五味子半升

乾薑 三兩

細辛 三兩

杏仁

半升去
皮尖

大黃 三兩

右八味以水一斗煮取三升去滓溫服半升日三

消渴小便利淋病衄證并治第十四

厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱饑而不欲食食
即吐衄下之利不止

按此條是傷寒論厥陰經正病與雜病消渴之義不

同必是錯簡

寸口脈浮而遲浮即為虛遲即為勞虛則衛氣不足勞則榮氣竭

按此條當在虛勞篇中錯簡在此

註寸口通指左右三部而言也浮而有力為風浮而無力為虛按之兼遲即為虛勞之診故主衛外榮內虛竭也

趺陽脈浮而數浮即為氣數即消穀而大堅氣盛則洩數洩數即堅堅數相搏即為消渴

按而大堅句不成文大字之下當有便字必是傳寫之遺

註
跌陽胃脈也胃脈浮盛按之而數為胃氣熱故善消穀也火盛消穀則大便必堅氣盛消水則小便必數故洩數即堅也堅數相搏即為消穀消渴之病

跌陽脈數胃中有熱即消穀引食大便必堅小便即數
註此復申上條大便堅小便數之義也

男子消渴小便反多以飲一斗小便一斗腎氣圓主之

註

飲水多而小便少者水消於上故名上消也食穀多而大便堅者食消於中故名中消也飲水多而小便反多者水消於下故名下消也上中二消屬熱惟下消寒熱兼之以腎為水火之藏也飲一溲一其中無熱消耗可知矣故與腎氣丸從陰中溫養其陽使腎陰攝水則不直趨下源腎氣上蒸則能化生津液何消渴之有耶

集註程林曰小便多則消渴經曰飲一溲二者不治今

飲一溲一故與腎氣丸治之腎中之動氣即水中
之命火下焦腎中之火蒸其水之精氣達於上焦
若肺金清肅如雲升而雨降則水精四布五經并
行自無消渴之患今其人必攝養失宜腎水衰竭
龍雷之火不安於下但炎於上而刑肺金肺熱葉
焦則消渴引飲其飲入於胃遊溢滲出下無火化
直入膀胱則飲一斗溺亦一斗也故用桂附腎氣

丸助真火蒸化上升津液何消渴之有哉

沈明宗曰男子二字是指房勞傷腎火旺水虧而成消渴者

腎氣丸方

見婦人雜病中

脈浮小便不利微熱消渴者宜利小便發汗五苓散主之

註脈浮病生於外也脈浮微熱熱在表也小便不利水停中也水停則不化津液故消渴也發表利水

止渴生津之劑惟五苓散能之故以五苓散主之也於此推之曰脈浮可知上條脈沉也曰微熱可知上條無熱也且可知凡脈沉無熱之消渴皆當用腎氣丸方也

五苓散方

見痰飲中

脈浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之

註此與上條文同義異文同者脈浮小便不利發熱

微熱渴欲飲水消渴也而義異者一以五苓散利

水發汗一以豬苓湯利水滋乾也審其所以義異
之意必在有汗無汗之間也何以知之一以發汗
為主其因無汗可知一以滋乾為主其因有汗可
知故文同而義異病同而治別也仲景之書言外
寓意處甚多在學者以意會之自識也

豬苓湯方

豬苓去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉

各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內膠烱消溫服七合日三服

渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之

註消渴則渴欲飲水水入即消而仍口乾舌燥者是熱邪盛也故以白虎加人參湯清熱生津也

白虎加人參湯方

見中暍中

渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

註渴欲飲水水入即吐名水逆者是裏熱微而水邪盛也故以五苓散利水止吐也

集註李彭曰內有積水故水入則拒格而上吐名水逆也五苓散利水故主之

渴欲飲水不止者文蛤散主之

註渴欲飲水水入則吐小便不利者五苓散證也渴欲飲水水入則消口乾舌燥者白虎人參湯證也渴欲飲水而不吐水非水邪盛也不口乾舌燥非

熱邪盛也惟引飲不止故以文蛤一味不寒不溫
不清不利專意於生津止渴也或云文蛤即今吳
人所食花蛤性寒味鹹利水勝熱然屢試而不效
嘗考五倍子亦名文蛤按法製之名百藥煎大能
生津止渴故嘗用之屢試屢驗也

文蛤散方

文蛤 五兩

右一味杵為散以沸湯五合和服方寸七

小便不利者有水氣其人苦渴栝蒌瞿麥圓主之

註小便不利水畜於膀胱也其人苦渴水不化生津

液也以薯蕷花粉之潤燥生津而苦渴自止以茯苓瞿麥之滲泄利水而小便自利更加炮附宣通陽氣上蒸津液下行水氣亦腎氣丸之變制也然其人必脈沉無熱始合法也

栝蒌瞿麥丸方

栝蒌根

二兩即花粉

茯苓

三兩

薯蕷 三兩

附子 一枚
炮

瞿麥 一兩

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日三服不知增至七八丸以小便利腹中溫為知

集解

李彭曰此方與五苓散同為利水生津之劑此用

薯蕷即五苓用白朮之義也但五苓兼外有微熱故用桂枝走表此內惟水氣故用附子溫下也

尤怡曰此下焦陽弱氣冷而水氣不行之證故以

附子益陽氣茯苓瞿麥行水氣觀方後云腹中溫
為知可以推矣其人苦渴則是水氣偏結於下而
燥火獨聚於上夫上浮之燄非滋不熄下積之陰
非煖不消而寒潤辛溫並行不悖此方為良法也
求變通者於此三復焉

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主
之

註
無表裏他證小便不利而渴者消渴水邪病也小

便不利不渴者小便癰閉病也主蒲灰散滑石白
魚散者蒲灰亂髮血分藥也滑石白魚利水藥也
然必是水鬱於血分故并主是方也觀東垣以通
關丸治熱鬱血分之小便不利則可知在血分多
不渴也主茯苓戎鹽湯者茯苓淡滲白朮燥濕戎
鹽潤下亦必是水濕鬱於下也鹽為渴者之大戒
觀用戎鹽則不渴可知也

集註
魏荔彤曰小便不利者所因有不同治法亦不一

仲師併列三方以俟主治者擇其善而從之

蒲灰散方

蒲灰 七分

滑石 三分

右二味杵為散飲服方寸匕日三服

滑石白魚散方

滑石 二分

亂髮 三分
燒

白魚 二分

右三味杵為散飲服半錢匕日三服

茯苓戎鹽湯方

茯苓半觔

白朮二兩

戎鹽

彈丸大一枚

右三味以水五升煮取三升分溫三服

淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中

註小便不利及淋病皆或有少腹弦急痛引臍中之

證然小便不利者水道澀少而不痛淋則澀數水道澀少而痛有不同也小便溺出狀如粟米者即

今之所謂石淋也

淋家不可發汗發汗必便血

註淋家濕熱畜於膀胱之病也若發其汗濕從汗去熱則獨留水府告匱熱迫陰血從小便出即今之所謂血淋也

集註高世栻曰淋家之膀胱津液先虛故不可發汗若

發汗更奪其津液則膀胱氣竭胞中併虛故必便血便血溺血也

水氣病脈證并治第十五

少陰脈緊而沉緊則為痛沉則為水小便即難脈得諸沉者當責有水身體腫重

按脈得諸沉者一條乃始論水氣病之脈當列於篇首但古本脈得諸沉之上有少陰脈緊而沉四句文義不屬并有脫簡不釋

註
欬喘而不腫脹謂之痰飲腫重而不欬喘謂之水氣沉脈得於諸部身體不腫重者當責為氣也腫

重者當責有水也以水畜於裏故水溢於表故腫重也

水病衄出者死

註水病肉腫衄當不見今衄出者是氣外散也故死

集註沈明宗曰衄得諸沉沉為氣鬱不行於表則絡衄

虛虛即水泛皮膚肌肉故身體腫重當責有水但沉為正水而正水乃陰盛陽鬱衄必沉極若陡見浮起是真氣離根之象故曰水病衄出者死若風

皮二水脈浮洪不在此例

問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿陰腫者何也答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈

註

病下利則虛其土傷其津也土虛則水易妄行津傷則必欲飲水若小便自利及汗出者則水精輸布何水病之有惟小便不利則水無所從出故必病水病水者脾必虛不能制水故腹滿也腎必虛不能主水故陰腫也於此推之凡病後傷津渴欲

飲水小便不利者皆當防病水也

集註

程林曰病下利則脾土衰而津液竭故渴引飲而土又不能制水故小便不利脾惡濕故腹滿腎主水故陰腫此為病水無疑若小便利則水行汗出則水散雖不藥而亦自愈矣

夫水病人目下有卧蠱而目鮮澤脈伏其人消渴病水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下之

按其人消渴之下古本有病水腹大小便不利其脈

沉絕者有水可下之四句與上文義不屬當另分
為一條在本門五條之次始合裏水脈證

註目下窠太陰也目下微腫水也惟土不能制水則
水汎溢為病故水始病必先見微腫於目下也有
卧蠶狀水病證也面目鮮澤水病色也沉甚脈伏
水病脈也消渴引飲水病因也此皆水病先見之
徵也

集註趙良曰內經色澤者病溢飲溢飲者渴而多飲溢

于腸胃之外又曰水陰也目下亦陰也腹者至陰之所居也故水在腹便目下腫也

靈樞曰水始起也目下微腫如蠶如新臥起之狀其人初由水穀不化津液以成消渴必多飲多飲則水積水積則氣道不宣故衄伏矣

沈明宗曰水外走則泛溢於皮膚肌肉內逆則浸淫於臟腑腸胃相隨胃衄上注於面目下如臥蠶之狀水主明亮而光潤故面鮮澤為水病之驗也

然水病因陽微陰盛經隧不利所以脈伏而胃中
津液水飲外溢皮膚肌肉不溉喉舌故作消渴誠
非真消渴也

師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗
乃愈

註諸有水者謂諸水病也治諸水之病當知表裏上
下分消之法腰以上腫者水在外當發其汗乃愈
越婢青龍等湯證也腰以下腫者水在下當利小

便乃愈五苓豬苓等湯證也

集註趙良曰身半以上天之分陽也身半以下地之分陰也而身之腠理行天分之陽小便通地分之陰故水停於天者開腠理而水從汗散水停於地者決其出關而水自出矣即內經開鬼門潔淨府法也

尤怡曰發汗利小便因其勢而利導之也
病水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下之

註

上條為水之在外在下者立法也若水在裏者非其治矣腹者至陰脾也故病水必腹大也水畜於內故小便不利也其鯀沉絕即伏鯀也鯀伏腹大小便不利裏水已成故可下之十棗神祐之類酌而用之可也

集註

程林曰腹大者為水在裏小便不利者為水不行是以鯀必沉伏也故宜下之以利其水

裏水者一身面目黃腫其鯀沉小便不利故令病水假

如小便自利此亡津液故令渴也越婢加朮湯主之

按越婢加朮湯主之七字當在後太陽病脈浮而緊
條發汗即愈之下文義始屬必是錯簡在此觀其
裏有水之文自可知非越婢加朮湯發表之藥所
能治矣

註此承上條言裏水未實不可下不可利之義也裏
水者謂裏有水也一身面目黃腫有水之證也脈
沉有水之脈也雖有是證脈猶必渴而小便不利

腹大者始為裏有水也設不腹大滿急此裏水未實不可下也若小便自利此亡津液作渴非裏有水作渴亦不可利小便也

集註

尤怡曰裏水水從裏積與風水不同故其脈不浮而沉而盛於內者必溢於外故一身面目悉黃腫也水病小便當不利今反自利則津液消亡水病已而渴病起矣

越婢加朮湯方見下

心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作枳實白朮湯主之
註心下堅大如盤邊如旋盤此裏水所作也似當下
而不可下者以堅大而不滿痛是為水氣虛結未
可下也故以白朮倍枳實補正而兼破堅氣行則
結開兩得之矣此裏水不可下之和劑也

集註趙良曰心下胃上脘也胃氣弱則所飲之水入而

不消痞結而堅必強其胃乃可消痞白朮健脾強
胃枳實善消心下痞逐停水散滯氣

程林曰此證如盤而不如杯是水飲散漫之狀也
以散漫於心下如盤不必辛熱之劑以發之但用
枳朮以散之得腹中爽而水自消矣

沈明宗曰見心下堅大如盤當審虛實寒熱脈之
浮沉遲數大小為異毋得執方而誤用也

尤怡曰言水飲所作者所以別於氣分也氣無形
以辛甘散之水有形以苦泄之

枳實白朮湯方

枳實七枚

白朮二兩

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中臍即
當散也

集解

李彥曰枳實消脹苦以泄之也白朮去濕苦以燥

之也後張元素治痞用枳朮丸亦從此湯化出但
此乃水飲所作則用湯以蕩滌之彼屬食積所傷
則用丸以消磨之一湯一丸各有深意非漫無主
張也

跌陽脈當伏今反緊本自有寒疝瘕腹中痛醫反下之
下之則胸滿短氣跌陽脈當伏今反數本自有熱消穀
小便數今反不利此欲作水

註此明裏有水兼寒兼熱誤下之義也裏水脈伏非
謂三部脈皆當伏乃謂跌陽胃脈當伏也若脈不
伏反緊其人必本自有寒也水寒同病則疝瘕腹
中痛醫誤以為裏水而下之水去寒留更虛其中
故胸滿短氣也若脈不伏反數其人必本自有熱

也水熱同病當消穀而小便數不病水也今小便反不利此欲作水之病也

集註趙良曰趺陽當伏者非趺陽胃氣之本脈也為水畜於下其氣伏故脈亦伏脈法曰伏者為水

魏荔彤曰趺陽有水邪則當伏以胃陽為衣濕陰寒所固閉故陽明之脈不出也今反緊不惟水盛於裏而且寒盛於中矣蓋其人不止有水氣之邪而更兼平日有積寒疝瘕腹中常常作痛水邪中

又兼寒邪也醫者不識其為陰寒乃以為水邪可
下雖水下沉而寒邪上逆故胸滿短氣矣此病跌
陽脈當伏今反數為本自有熱然本自有熱則當
消穀小便數大便堅如傷寒胃實之證也今小便
反不利則知為欲作水與濕熱之邪無疑也

肝水者其腹大不能自轉側脇下腹痛時時津液微生
小便續通

註以上發明表裏上下之水以下發明五臟氣血之

水也肝主筋腹脇是其部也水邪干之外則筋緩不能自轉側內則腹大脇痛淋洩也

集註魏荔彤曰肝水者水附肝則肝水也肝經有水必

存兩脇故腹大而脇下痛少陽陰陽往來之道路有邪窒礙故不能自轉側肝有水邪必上冲胸咽故時時津液微生及上升而下降小便不利者又續通此水邪隨肝木往來升降之氣上下為患也見此知肝經有水當於肝臟治之也

尤怡曰肝之府在膈而氣連少腹肝之水不行則腹大不能轉側膈下腹痛也時時津液微生小便續通者肝喜沖逆而主踈泄水液隨之而上下也心水者其身重而少氣不得卧煩而躁其人陰腫

按其人陰腫四字當在腎水條內錯簡在此

註心主脈膈中是其部也水邪干之外則周身之脈不行其身重也內則少氣心煩不得卧而躁也

集註程林曰內經云心主身之血脈上經曰水在心心

下堅築短氣是以身重少氣也內經曰諸有水病者不得卧夫心屬火水在心是以不得卧而煩躁也

魏荔彤曰夫水邪亦積聚之類也切近於其處則伏留於是臟即可以臟而名證水附於心則心水也心經有水四肢百骸皆可灌注故身重氣為水邪所阻故少氣水邪逼處神魂不安故不得卧神明擾亂故躁而煩見此知心經有水當於心經治

之也

脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣則小便難

註脾主腹四肢是其部也水邪干之外則四肢苦重
內則腹大少氣小便難也

集註魏荔彤曰脾水者水附於脾則脾水也脾專主腹

故腹大脾主旋運又主四肢旋運不利故四肢苦
重津液不生氣不行於上下則阻礙不通故上則

苦少氣下則小便難見此知有水在脾當於脾藏治水也

尤怡曰脾主腹而氣行四肢脾受水氣則腹大四肢重津氣生於穀穀氣運於脾脾濕不運則津液不生而少氣小便難者濕不行也

肺水者其身腫小便難時時鴨澹

註肺主氣皮毛是其部也水邪干之外則周身皮腫內則不輸小便大腸乃其府水走大腸故鴨澹也

集註

趙良曰肺主皮毛行榮衛與大腸合今有水病則水充滿皮膚肺本通調水道下輸膀胱為尿溺今既不通水不得自小便出反從其合與糟粕混成鴨溏也

魏荔彤曰肺水者水附於肺則肺水也肺主氣氣引水行亦能使之周身浮腫肺不肅則氣化壅故小便難小便難則清濁不分故便鴨溏此知為有水在肺當於肺藏治水也

尤怡曰鴨澹如鴨之後水糞雜下也

腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦

按面反瘦之下當有上條其人陰腫四字

註腎主腰足陰是其部也水邪干之外則陰腫陰下濕足冷面瘦內則腹大臍腫腰痛不得溺也此五者指水氣等脹為言故俱不喘欬也

集註程林曰腎者胃之關也關門不利故令聚水而生

病是以有腹大臍腫之證也腰者腎之外候故令腰痛膀胱者腎之府故冷不得溺也以其不得溺則水氣不得泄浸漬於臍囊而為陰汗流注於下焦而為足冷夫腎為水藏又被水邪則上焦之氣血隨水性而下趨故其人面反瘦非若風水裏水之面目浮腫也

魏荔彤曰腎水者水附於腎則腎水也腎主少腹少腹水濕固洏故腹大臍腫腰痛腰以下俱腎主

之也水濕在下焦膀胱之氣反塞故不惟小便難而且竟不得溺陰寒下盛故陰下濕如牛鼻上汗冷而且粘其足皆逆冷也面乃陽之部位下陰盛上陽衰故面必瘦見之知水在腎當於腎藏治水也

尤怡曰身半以下腎氣主之水在腎則腰痛臍腫腹大也不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷者腎為陰水亦為陰兩陰相得陽氣不行而濕寒獨

勝也面反瘦者面為陽陰盛於下則陽衰於上也
師曰寸口脈沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏跌
陽脈伏水穀不化脾氣衰則驚澹胃氣衰則身腫少陽
脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經
為血血不利則為水名曰血分

註寸口兩寸也脈沉而遲沉則為水遲則為寒水寒
相搏於胸中則陽氣不運故趺陽兩關之脈伏而
不起水穀不化也若脾氣衰則驚澹胃氣衰則身

腫也少陽右尺脈陷下少陰左尺脈細小亦因寒
水太甚命火受制故男子水精不化小便為之不
利女子血化為水經水為之不通也經血而曰經
水者以水為血之體也女子以血為主故曰血分
也

集註趙良曰仲景脈法寸口多與跌陽合何也蓋寸口

屬肺手太陰之所過肺朝百脈十二經各以其時
來見於寸口脾胃二經出在右關胃乃水穀之海

五藏皆稟氣於胃則胃又五藏之本所以經脈尤為諸經之要領也邪或干於胃者必再就趺陽診之趺陽胃脈之源也

尤怡曰此合診寸口趺陽而知為寒水勝而胃陽不行也胃陽不行則水穀不化水穀不化則脾胃俱衰脾氣主裏故衰則驚澹胃氣主表故衰則身腫也少陽者生氣也少陰者地道也而俱受氣於脾胃脾胃衰則少陽脈卑而生氣不榮少陰脈細

而地道不通男子則小便不利婦人則經血不通
而其所以然者則皆陽氣不行陰氣乃結之故曰
血分者謂雖病於水而實出於血也

師曰寸口脈遲而濇遲則為寒濇為血不足趺陽脈微
而遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足
逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿腸鳴相逐氣轉勝
肱榮衛俱勞陽氣不通即身冷陰氣不通即骨疼陽氣
前通則惡寒陰氣前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行

大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分

按名曰氣分之下當有下條桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯主之十五字

註寸口脈遲為寒脈瀋少血跌陽脈微乏氣遲亦為寒是則氣血俱虛為寒氣所干榮衛不利陰陽不通故身寒骨痛手足逆冷腹滿腸鳴惡寒麻痺失氣遺溺也此氣血俱虛寒氣內客之氣脹故曰氣分而下條發明主治用桂枝去芍藥加麻黃附子

卷二十一
細辛湯者溫養榮衛陰陽發散寒邪之氣也

集註

程林曰氣散必從前後而去邪氣實則失氣於後

正氣虛則遺溺於前也

尤怡曰微則為氣者為氣不足也寒氣不足該寸口跌陽為言寒而氣血復不足也寒氣不足則手足無氣而逆冷榮衛無源而不利由是藏府之中真氣不充而客寒獨勝則腹滿腸鳴相逐氣轉勝於下輸也榮衛俱勞者榮衛俱乏竭也陽氣溫

於表故不通則身冷陰氣榮於裏故不通即骨疼
不通者虛極而不能行與有餘而壅者不同陽前
通則惡寒陰前通則痺不仁者陽先行而陰不與
俱行則陰失陽而惡寒陰先行而陽不與俱行則
陽獨滯而痺不仁也蓋陰與陽常相須也不可失
失則氣機不續而邪乃著不失則上下交通而邪
不容故曰陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃
散失氣遺溺謂分虛實而散也曰氣分者謂寒氣

乘陽之虛而病於氣也

氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯主之

按氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作之十六字當是衍文觀心下堅之本條自知桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯主之十五字當在上條氣分之下義始相屬正是氣分之治法必是錯簡在此桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯方

桂枝 三兩

生薑 三兩

甘草 二兩

大棗 十二枚

麻黃

細辛 各一兩

附子 一枚

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如蟲行皮中即愈

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證骨節疼痛惡風皮水其脈亦浮外證跗腫

按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗正水其脈沉遲外證自喘石水其脈自沉外證腹滿不喘黃汗其脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿

註風水得之內有水氣外感風邪風則從上腫故面浮腫骨節疼痛惡風風在經表也皮水得之內有水氣皮受濕邪濕則從下腫故肘浮腫其腹如鼓按之沒指水在皮裏也非風邪故不惡風因水濕故不渴也其邪俱在外故均脈浮皆當從汗從散

而解也正水水之在上病也石水水之在下病也
故在上則胸滿自喘在下則腹滿不喘也其邪俱
在內故均脈沉遲皆當從下從溫解也黃汗者汗
出蘖汁色也其脈沉遲藏內有寒飲身發熱者經
外有伏熱寒飲故胸滿四肢頭面浮腫伏熱若久
不愈故必致癰膿也由此推之可知黃汗是內飲
外熱蒸鬱於中從土化而成也以黃汗而列水病
之門者亦因水之為病而腫也

集程林曰風水與皮水相類屬表正水與石水相類屬裏但風水惡風皮水不惡風正水自喘石水不自喘為異耳

尤怡曰風水水為風搏因風而病水也風傷皮毛而濕流關節故脈浮惡風而骨節疼痛也皮水水行皮中內合肺氣故其脈亦浮不兼風故不惡寒也其腹如鼓即內經鑿鑿然不堅之意以其病在皮膚而不及腸藏故外有脹形而內無喘滿也水

在皮者宜從汗解故曰當發其汗正水腎藏之水
自盛也石水水之聚而不行者也正水乘陽之虛
而浸及上焦故衄沉遲而喘石水因陰之盛而結
於少腹故衄沉腹滿而不喘也黃汗汗出沾衣如
蘗汁得之濕熱交病而濕居熱外其盛於上而陽
不行則身熱胸滿四肢頭面腫久則浸及於裏而
榮不通則逆於肉裏而為癰膿也

衄浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風強則為隱

疹身體為痒痒為泄風久為痼癩氣強則為水難以俯仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此為風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此為黃汗

按身體洪腫之洪字當是浮字此為黃汗四字當是衍文

註六脈俱浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏之病若風強於氣相搏為病則偏於營故為隱疹身體為痒痒者肌虛為風邪外薄故也名曰泄風即

今之風燥瘡是也故日久不愈則成痂癩痂癩疥
癬癘癩之類是也若氣強於風相搏為病則偏於
衛故為水氣難以俯仰即今之支飲喘滿不得卧
也若風氣兩相強擊為病則為風水故通身浮腫
也以上諸證皆屬肌表故當發汗汗出乃愈也風
水無汗當以越婢湯發汗若汗出惡風則為表陽
虛故加附子也若不惡風小便通利非表陽有寒
乃上焦有寒也上焦有寒惟兼病水者則其人口

內必多生涎沫也

集註

尤怡曰風天之氣氣人之氣是皆失其和者也風

濕相搏風強則氣從風而浸淫肌體故為癰疹氣
強則風從氣而鼓湧水液故為水風氣並強兩相
搏擊而水液從之則為風水汗之則風去而水行
故曰汗出乃愈若惡風者表虛也不惡風而小便
通利者以上焦有寒不能約束津液故其口多涎
也

寸口脈沉滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人之目裹上微擁如蠶新卧起狀其頸脈動時時欬按其手足上陷而不起者風水

註此承上條詳申風水之證脈也寸口脈沉而滑中有水氣之證也面目腫大中有水氣之證也有寒者其脈沉遲則為石水也有熱者其脈沉滑名曰風水也視其人之目胞上微擁似蠶如新卧起之狀人迎頸脈動甚時欬按其腫之手足陷而不起

者皆風水之證也

集註

趙良曰內經云脈沉曰水脈滑曰風面腫曰風目

腫如新卧起之狀曰水頸脈動喘欬曰水又腎風者面跗龐然少氣時熱其有跗腫者亦曰本於腎名風水皆出內經也

程林曰沉者就下之性滑者流行之象故沉滑者中有水也面腫曰風風鬱於經則熱故面跗腫大有熱名曰風水內經曰諸有水者微腫先見於目

下也水者陰也目下亦陰也腹者至陰之所居故
水在腹者必使目下腫也頸脈人迎脈也水邪干
土則頸脈動水之本在腎水之標在肺故時時欬
也以手按其腹隨手而起此屬水脹如按水囊者
必隨手而起今風水搏於手足肘屬肌肉之間按
而散之猝不能聚故陷下而不起也

風水脈浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之腹痛加
芍藥

註此承上條風水詳申其證以明其治也風水之病
外風內水也。脈浮惡風者風也。身重腫者水也。汗
出表虛故用防己黃耆湯固表以散風水也。若腹
痛加芍藥甘草以調中也。

防己黃耆湯方

見濕病中

太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛反不疼身體反重而
酸其人不渴汗出即愈此為風水惡寒者此為極虛發
汗得之渴而不惡寒者此為皮水身腫而冷狀如周痺

胸中塞不能食反聚痛暮躁不得眠此為黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此為脾脹其狀如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗

按脾脹之脾字當是肺字是傳寫之譌發汗即愈之下當有前條越婢加朮湯主之七字

註此又詳申風水皮水黃汗肺脹四證之治法也太陽病謂頭痛發熱惡風也脈浮而緊似傷寒也傷寒法當骨節疼痛反不疼身體反重而酸面目浮

腫其人不渴非傷寒也乃風水也發汗汗出即愈也若愈後而惡寒者此為過於發汗極虛得之當補表陽自可愈也有是證渴而不惡寒似傳裏也但跗浮腫其腹如鼓乃皮水也有是證胸中窒反聚痛不能食暮躁不得卧似裏實也但身腫而冷麻木如痺此為欲作黃汗也痛在骨節似傷寒也但其狀如水腫欬喘不渴此為肺脹也已上四證皆初病皮毛狀類傷寒故均以越婢加朮湯主之

發汗即愈也若渴而下利小便數者則津液已奪故不可發汗也

集註趙良曰脾脹恐是肺字之誤靈樞經云肺是動則病肺脹滿膨膨而喘咳也

魏荔彤曰其狀如腫者按其手足未至陷而不起故曰如腫似腫而實非腫也

尤怡曰太陽有寒則脈緊骨疼有濕則脈濡身重有風則脈浮體痠此明辨也今得傷寒脈而骨節

不疼身體反重而痠即非傷寒乃風水外勝也風水在表而非裏故不渴風固當汗水在表者亦宜汗故曰汗出即愈然必氣盛而實者汗之乃愈不然則其表益虛風水雖解而惡寒轉增矣故曰惡寒者此為極虛發汗得之若其渴而不惡寒者則非病風而獨病水不在皮外而在皮中視風水為較深矣其證身腫而冷狀如周痺周痺者寒濕痺其陽也皮水為水氣淫於膚也胸中窒不能食者

寒襲於外而氣窒於中也反聚痛暮躁不得眠者
熱為寒鬱而寒甚於暮也寒濕外淫必流關節故
曰此為黃汗痛在骨節其咳而喘不渴者水寒傷
肺氣攻於表有如腫病而實同皮水故曰發汗則
愈然而諸病若渴而下利小便數者則不可謂水
氣當汗而槩發之也仲景丁寧之意豈非慮人之
津液先亡也哉或問風水外證骨節疼此云骨節
反不痛身體反重而痠皮水不渴此云渴何也曰

風與水合而成病其流注關節者則為骨節疼痛
其浸淫肌體者則骨節不疼而身體痠腫由所傷
之處不同故也皮水不渴者非言皮水本不渴也
謂腹如鼓而不渴者病方外盛而未入裏猶可發
其汗也此所謂渴而不惡寒者所以別於風水之
不渴而惡風也

風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱越婢
湯主之惡風加附子

註此又承上條風水互詳其證而變其治也風水之邪全在表而不在裏故惡風一身悉腫脈浮不渴也初本無汗身無大熱續自汗出而不惡風寒表不虛也故用越婢湯以發之若惡風甚者表陽虛也前方加附子一枚以補其在表之陽也

越婢湯方

麻黃六兩

石膏半觔

生薑三兩

甘草二兩

大棗

十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

惡風者加附子一枚炮

風水加朮四兩

皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者防已茯苓湯主之

註此承皮水互詳其證以明其治也皮水之病是水

氣相搏在皮膚之中故四肢聶聶動也以防已
茯苓湯補衛通榮祛散皮水也

集註

沈明宗曰此邪在皮膚而腫也風入於衛陽氣虛

滯則四肢腫經謂結陽者腫四肢即皮水也皮毛
受風氣虛而腫所謂水氣在皮膚中邪正相搏風
虛內鼓故四肢聶聶而動是因表虛也蓋三焦之
氣同入膀胱而行決瀆今水不行則當使小便利
而病得除故防已茯苓除濕而利水以黃耆補衛

而實表實則邪不能容甘草安土而制水邪桂枝以和榮衛又行陽化氣而實四末俾風從外出水從內洩矣

防己茯苓湯方

防己三兩

黃耆三兩

桂枝三兩

茯苓六兩

甘草三兩

右五味以水六升煮取二升分溫三服

裏水越婢加朮湯主之甘草麻黃湯亦主之

按裏水之裏字當是皮字豈有裏水而用麻黃之理
閱者自知是傳寫之譌

註
皮水表虛有汗者防已茯苓湯固所宜也若表實
無汗有熱者則當用越婢加朮湯無熱者則當用
甘草麻黃湯發其汗使水外從皮去也

越婢加朮湯方

於越婢湯中加朮四兩

甘草麻黃湯方

甘草二兩

麻黃四兩

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘草煮取三升溫服一升重覆汗出不汗再服慎風寒

厥而皮水者蒲灰散主之

按厥而二字當是衍文

註水在皮膚浸淫日久必然腐潰而出水也當以蒲灰散敷之以燥水也

蒲灰散方見消渴中

水之為病其脈沉小屬少陰浮者為風無水虛脹者為氣水發其汗即已脈沉者宜麻黃附子湯浮者宜杏子湯

按為氣水之氣字當是風字若是氣字則無發汗之理且通篇並無氣水之病

註水之為病其脈沉小屬少陰水也今脈不沉小而浮浮者為風非少陰水也若無水虛脹者為風水

也風水發其汗即已風水脈沉者宜麻黃附子湯
汗之脈浮者宜杏子湯汗之

麻黃附子湯方

麻黃三兩

甘草二兩

附子

一枚
炮

右三味以水七升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取
二升半溫服八分日三服

集解沈明宗曰麻黃附子湯今人置之不講余特舉而

明之麻黃附子通陽開竅治水妙劑今人惟用腎
氣湯丸壅補其內致陽氣不宣轉補轉壅邪無出
路水腫日增咳血而死者不知凡幾矣

杏子湯方

麻黃 四兩

杏仁 五十箇

甘草 二兩
炙

右水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取
三升去滓溫服一升得汗止服

問曰黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如蘗汁脈自沉何從得之師曰以汗出入水中浴水從汗孔入得之宜黃耆芍藥桂枝苦酒湯主之

註此承黃汗互詳其證以明其治也黃汗屬濕故身體腫屬風故發熱汗出而渴狀如風水者謂面目浮腫也汗沾衣色正黃如蘗汁謂汗出粘黃也脈自沉者謂從水得之也究其得之之由以汗出入

冷水中浴則悽愴之寒內入遏鬱汗液於肌腠從
土蒸化而出故色黃也宜黃耆桂枝解肌邪以固
衛氣白芍苦酒止汗液以攝營氣營衛調和其病
已矣

集註

程林曰汗出則元府開入水浴則悽愴之水寒藏

留於腠理皮膚之中則身腫發熱也汗出沾衣如
藥汁則津液內竭是以汗出而渴也身腫雖狀如
風水但風水之脈不沉汗不黃口不渴為異耳

李升璽曰按汗出浴水亦是偶舉一端言之耳大約黃汗由脾胃濕久生熱積熱成黃濕熱交蒸而汗出矣

魏荔彤曰黃汗者汗出之色黃而身不黃與發黃之證不同也

尤怡曰黃汗之病與風水相似但風水脈浮而黃汗脈沉風水惡風而黃汗不惡風為異其汗沾衣色正黃如蘗汁則黃汗之所獨也風水為風氣外

合水氣黃汗為水氣外合熱氣熱被水遏互鬱交
蒸汗液則黃用黃耆桂枝芍藥三味行陽以益陰
則榮氣和而衛氣周蓋欲使榮衛大行而邪氣畢
達耳

黃耆芍藥桂枝苦酒湯方

黃耆五兩

芍藥三兩

桂枝三兩

右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服

一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也

方服後心煩者以苦酒止汗太急也蓋汗出於心急解
止之則不得出故心煩也至六七日乃解者正復而邪自退也

集解魏荔彤曰古人稱醋為苦酒非另有所謂苦酒也

美酒醢即人家所製社醋即鎮江紅醋是也又醋之劣者即白酒醋各處皆是總以社醋入藥

尤怡曰苦酒阻者欲行而未得遽行久積藥力乃自行耳故曰服至六七日乃解

黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身常暮卧盜汗出者此勞氣也若汗出已反發熱者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒輕者久久必身潤潤即胸中痛又從腰以上必汗出下無汗腰髀弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此為黃汗桂枝加黃耆湯主之

按此承黃汗詳申其證也但文義未屬必是錯簡不

釋

桂枝加黃耆湯方

桂枝

芍藥

各二兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

十二枚

黃耆

二兩

右六味以水八升煮取三升溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆取微汗若不汗更服

寸口脈浮而遲浮脈則熱遲脈則潛熱潛相搏名曰沉
跌陽脈浮而數浮脈即熱數脈即止熱止相搏名曰伏
沉伏相搏名曰水沉則絡脈虛伏則小便難虛難相搏
水走皮膚即為水矣

按此條文義不屬不釋

寸口脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒水不沾流走於
腸間


按此條必有脫簡不釋

問曰病者苦水面目身體四肢皆腫小便不利脈之不
言水反言胸中痛氣上衝咽狀如炙肉當微欬喘審如
師言其脈何類師曰寸口脈沉而緊沉則為水緊則為
寒沈緊相搏結在關元始時當微年盛不覺陽衰之後
榮衛相干陽損陰盛結寒微動腎氣上衝咽喉塞噎脇
下急痛醫以為流飲而大下之氣擊不去其病不除後
重吐之胃家虛煩咽燥欲飲水小便不利水穀不化面
目手足浮腫又與葶薤圓下水當時如小差食飲過度

腫復如前胸脇苦痛象若奔豚其水揚溢則浮欬喘逆
當先攻擊衝氣令止乃治欬欬止其喘自差先治新病
病當在後

按此條文義不屬不釋

御纂醫宗金鑑卷二十一



總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣莫瞻菴

謄錄監生臣周翥華